

А.Н. Филин

телями достаточно одноразового опрыскивания растений слабым раствором бордосской жидкости или просто раствором медного купороса, карбофоса или фитоверма.

Основными болезнями настурции являются кольцевая пятнистость и мозаика (рисунок светло-зеленого цвета на листьях). Больное растение медленно развивается, меняет окрас цветков, снижается количество цветоносов. Причина заболевания – вирус, передаваемый с семенами. Единственный способ борьбы – удаление и сжигание заболевших растений с корнями, а также удаление почвы, на которой росло зараженное растение.

Сбор сырья

Свежие цветки и листья для салатов и лекарственных нужд собирают в течение всего вегетационного сезона, до начала осеннего увядания. Плоды для маринования заготавливают зелеными, для использования в лекарственных целях – вызревшими. В последнем случае из них извлекают семена.

Для сушки облиственные цветущие побеги срезают, раскладывают тонким слоем в тени на воздухе либо в сушилке и периодически ворошат или подвешивают на веревках. Хранят сырье 2 года в бумажных пакетах или холщовых мешочках.

Алексей ФИЛИН,
научный сотрудник Ботанического сада МГУ
«Аптекарский огород»,
кандидат биологических наук.

Я (ФИО) _____

даю разрешение на публикацию моих писем в журнале
«Предупреждение Плюс» в полном объеме.

Подпись _____

Дата « ____ » _____

202 ____ г.