

5 СЕЗОННЫХ ДЕЛ ДЛЯ ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ

Август - самый урожайный месяц, когда мы пожинаем плоды трудов своих в прямом и переносном смысле. Но сезонные работы никто не отменял. Растения по-прежнему нуждаются в заботе и уходе.

1 УДАЛЕНИЕ ПОРОСЛИ

Удалите прикорневую поросль, чтобы она не отнимала питание и силы у плодоносящей части деревьев.

Именно в августе прикорневая поросль становится наиболее заметной, и именно сейчас ее стоит удалить. Если этого не сделать, ветви будут забирать питание у дерева, а в запущенной стадии такие побеги даже перегоняют по силе роста само дерево и губят его. Так что срезайте еще молодые, неодревесневшие прутики, причем как можно ниже, у самого ствола.

Если дерево запустили и вокруг ствола вырос целый порослевый лес, раскопайте землю вокруг и вырежьте у самого основания на кольцо все лишние побеги. Большие срезы замажьте садовым варом или масляной краской. Затем снова присыпьте почвой.

Причины появления поросли:

а) дерево посажено высоко, так, что основания корней не скрыты почвой, в этом случае просто досыпьте земли;

б) проверьте, не забыли ли вы снять этикетку - бывает, садовод сажает молодое деревце вместе с ней, и со временем обвязка начинает перетягивать ствол у основания, врезается в ко-



Вариант зонтичной подпоры на примере штамбовой смородины

ру, и к корням поступает меньше питательных веществ из кроны, вот и вырастает на корнях собственная «доставка питания»;

в) механическое повреждение дерева: отломилась большая ветка, произошел задира коры, образовалась трещина между ветвями - все это служит сигналом растению вырастить молодые здоровые побеги, и расти они могут от корня и основания ствола;

г) чрезмерно сильная обрезка, в том числе удаление всех ветвей при перепрививке: такие действия приводят к нарушению баланса питания - корни поставляют его в достаточном количестве, а у надземной части нет сил ответить тем же, в результате корневая система не хватает продуктов ассимиляции, которые поставляют листовой аппарат;

д) подвой несовместим с привоем - снова возникает дисбаланс питания и появляется поросль; обычно в этом случае привой в месте прививки заметно утолщается, дерево слабо растет и раньше срока окрашивает листья в осенние цвета и



Яблоне, перегруженной урожаем, требуются подпоры

сбрасывает, при этом созревание плодов может ускоряться.

2 УСТАНОВКА ПОДПОР

Под ветки с большим количеством плодов установите подпоры, причем между подпорой и веткой положите ткань или картон, чтобы уменьшить трение и травмирование коры.


Самый простой вариант - это длинная палка с рогатиной на конце или доска, нижнюю часть которых луч-

ше затесать топором для фиксации в земле.

Важно правильно установить подпоры: немного наклоните ее по направлению к дереву и разместите там, где, по вашему мнению, будет основной груз ветви. Если разместить подпоры ближе, то ветка может отломиться под тяжестью плодов сразу за ней.

Устанавливать подпоры проще всего начиная с верхних ярусов и спускаясь к нижним.

Есть и более сложные ва-



Сбор урожая лучше проводить утром в сухую погоду