

Урожайные
Урядки

КОГДА ТОМАТЫ
МОЖНО
НЕ ФОРМИРОВАТЬ

ЩИПАТЬ ИЛЬ НЕ ЩИПАТЬ?



Pisanello Da Bruschetta

Томаты отличаются не только характерными сортовыми чертами, но и типом роста. И он во многом определяет, как именно нужно работать с конкретным сортом.

Я выращиваю свои томаты на востоке Подмосковья, на границе Московской и Владимирской областей. Здесь почти всегда высокая влажность (сказывается болотистая местность Мещерского края). Однако детерминантные, полудетерминантные и индетерминантные сорта у меня растут и в теплице, и в открытом грунте. Правда, уход за ними различается.


Я пришла к выводу, что любые томаты (даже невысокие детерминантные сорта) надо подвязывать,

Попробуем разобраться, чем индетерминантный сорт отличается от полудетерминантного и детерминантного.

Детерминантный томат имеет ограниченный (определенный) рост, на основном побеге заканчивающийся цветочной завязью. Превос соцветия закладывается, как правило, над 5-6-м листом, последующие - через 1-2 листа.

Впрочем, приклетому мнению, детерминантные сорта могут быть и низкорослыми, и среднерослыми и в защищенном грунте способны достигать высоты 150 см. Урожай созревает дружно, большую его часть удаётся снять до массового развития фитофтороза. Нередко в прохладное и дождливое лето детерминантные сорта и гибриды могут вести себя как томаты, получившие в народе название «полудетерминантные»: верхушка, они продолжают рост за счет побегов возобновления.

Индетерминантный томат может цвести и плодоносить больше 9 месяцев. Однако в условиях короткого вегетационного периода подобные сорта и гибриды в течение сезона формируют (ведут в 1-3 стебля), а в августе прищипывают точку роста, направляя все силы растения на созревание урожая.



Sweet Kendy Circle

если нет желания собирать плоды с земляными боками.

Кроме того, если площадь участка невелика, а сортов много, то многие детерминантные (а иногда и индетерминантные) сорта допустимо высаживать по два в лунку и вести в не-

сколько стволов. Но при такой посадке особенно важно обеспечить растения нужным количеством питательных веществ. Тогда они справятся и с набором кистей, и с их созреванием.

Теперь расскажу о том, как формирую растения






Сливка Бендрика желтая



Турандот



Banded Amazon

Традиционная формировка детерминантных сортов и гибридов предполагает принудительное укорачивание куста после 3-5 листьев (на высоту прищипки главного побега над цветочной кистью) и влияет сила роста конкретного сорта). Из пазушных почек формируется 2-3 пасынка. После того как на каждом образуется по 2-3 цветочных кисти, прищипывают и их.

Продлить период плодоношения детерминантного томата можно, переводя точку роста на самый сильный пасынок, едва на главном стебле (а потом и на пасынке) сформировался 2-3 соцветия. Таким способом куст до осени регулярно переводят на пасынок замещения. Над последним соцветием оставляют один-два листа.

Какой способ лучше? Единого решения нет, все зависит от погоды и риска появления болезней, сорта и развития растений.

Детерминантные сорта с плодами небольшого размера подвергаю незначительному пасынкованию. Рассмотрю на примере любимого сорта *Sandy Sweet Icicle* (*Конфеты сладкие сосульки*). Это среднеранний дет высотой 0,5-0,7 м с плодами массой 30-50 г. Очень болезнестойчивый. Его я выращиваю в открытом грунте, высаживая два растения в лунку. Листья срезаю до первых кистей, выше - по мере необходимости. Растение дает умеренное количество пасынков, удаляю лишь несколько из них. Томат получается достаточно загущенным, но все же успевает дать большое количество спелых плодов. По такой же методике работаю с растущими

в открытом грунте сортами *Сливка Бендрика* и *Бой с тенью*.

Сливка Бендрика - детерминантный, среднеспелый, низкорослый сорт с плодами-сливками массой 60-90 г. *Гном Бой с тенью* - детерминантный среднеспелый сорт с плодами массой 80-100 г. В открытом грунте *Бой с тенью* я вел в 4 ствола, томат набрал много плодов.

Рассмотрим сорт *Турандот*. Детерминантный сорт с гладкими грушевидными красными плодами массой 80-120 г. Рос в открытом грунте, один в лунке, но вел в три ствола и активно пасынковала, обрезая листья до первой кисти и далее по мере необходимости. Урожай отличный!



Витязь


Строго по одному в лунку я высаживаю томаты с мощными кустами, например *Мармелад желтый*. Несмотря на то что томат детерминантный и в открытом грунте не вырос



Мармелад желтый



Shadow Boxing



Osa o Blonde Avec 1 etons

у меня выше 0,7 м, ему требуется простор. Плоды у него округлые, массой 50-120 г. Вела в несколько стволов - и успешно.

Методику выращивания крупноплодных деток рассмотрим на примере *Banded Amazon* (Полосатая амазонка). Высота куста не превышает 0,8 м, сроки созревания средние, масса плодов 100-200 г. У меня он рос в открытом грунте - два корня в лунке. Одно из растений велось в два ствола. Получила хороший урожай, значит, методика себя оправдала.

Теперь перейдем к томатам индетерминантным. Общеизвестные правила их формирования - оставлять только главный побег и удалять все боковые пасынки, едва они достигнут длины 3-4 см. Но практика показала: к формированию высокорослых сортов тоже надо подходить диффе-

ренцированно. Как и в случае с детерминантными томатами, приходится учитывать особенности развития и массу плодов.

У сортов крупноплодных удаляют все пасынки, растение ведут в один, максимум (в теплице) в два ствола. Если поставить целью вырастить томат-гигант, то куст нужно вести в один ствол и обязательно нормировать количество завязей в кисти. Особенно это важно для сортов с картофельным типом листа. Я заметила, что они переносят загущенность гораздо хуже, чем сорта с регулярными листьями.

Рассмотрим формирование томата на примере сорта *Big Zac*. Это среднеспелый индет, который считают одним из самых крупноплодных. При тщательной формировке и ведении в один ствол масса томатов может достигать 1 кг (в теплых регионах). Но в средней полосе обычный вес плодов при такой формировке составляет 300-700 г. Я вела томат в два ствола в открытом грунте, томаты получились массой 200-400 г.

Очень наглядным получился опыт с томатом *NoF Purple Strawberry*. Этот среднеспелый индет дает плоды массой 150-300 г. Я выращивала его и в теплице, и в открытом грунте. В теплице сажала по два в лунку, каждый вела в два ствола. Урожайность отличная, к 21 августа томаты практически полностью созрели. В открытом грунте сажала порознь и вела в два ствола. Урожайность средняя, плоды достаточно крупные, но к 12 августа



NoF Purple Strawberry

только начали созревать. Пришлось к середине августа сделать кусту «модельную стрижку»: удалить листву и все цветоносы, перенаправляя все силы растения на созревание уже наливающихся плодов.

Osu o Blonde Avec Tendons - высокорослый среднеспелый сорт с плодами-сливками массой 100-250 г. Выращивала его в открытом грунте, высаживая по два корня в лунку. Каждое растение вела в два ствола, обрезая листву по мере возможности. Урожайность отличная!

А вот томат *Pisanello Da Bruschetta*, среднеспелый индет с плодами массой 80-100 г, вела в несколько стволов, высаживая по два в лунку. Растения дали обильный урожай. Следовательно, увлекаться формированием даже индетерминантных томатов с некрупными плодами нет необходимости, растения прекрасно справляются с урожаем!

Раннеспелый высокорослый сорт *Elizabeth Stefański* дает плоды массой 50-100 г. Его сажала по два в лунку, каждый вела в несколько стволов, но пасыновала и обрезала листву активно.

Итак, формирование томатов должно производиться по правилам, но нельзя не учитывать сортовые особенности, в частности, тип роста, листву и массу плодов. Мелкоплодные сорта и гибриды (черри, коктейльные), даже индетерминантные допустимо высаживать по два в лунку и вести в несколько стволов. Но при этом обязательно активно пасыновать и обрезать листву. Ну а август - уже поворотная точка. В этом месяце огородник должен оценить погодные условия и степень зрелости плодов, принимая решение о времени прищипывания точек роста растений томата.

Л. ГАНЗЕН,
коллекционер томатов